

INRA-JKI Col-58E

VassV6R08s101-105



Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp213

5000Mtp 213


INRA-JKI Col-58E


V6R08s101-105


INRA-JKI Col 58E


5000Mtp 213

VASSAL 2015









Formulaire de description 5 / 8
Observation à maturité physiologique

Année : 2016-2017

Code cépage :

Code introduction : 5000 Mlp 213

Observateur : J. LACONDE

[+ V6R7/101-105] 10/11

Nom introduction : INRA-JKI G2 58E

Emplacement : V6R8/101-105 + 106-110

GRAPPE

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Oiv 202 | Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 15 | très courte (<10 cm) | courte (10-14 cm) | moyenne (14-18 cm) | longue (18-25 cm) | très longue (>25 cm) |
| Oiv 203 | Largeur Valeur absolue (en cm) : 12 | très étroite (<5 cm) | étroite (5-10 cm) | moyenne (10-15 cm) | large (15-20 cm) | très large (>20 cm) |
| Oiv 204 | Compacité | très lâche | lâche | moyenne | compacte | très compacte |
| 000-46 | Millerandage | nul ou t. fb. | faible | moyen | fort | très fort |
| Oiv 206 | Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 7.5 | très court (<3 cm) | court (3-5 cm) | moyen (5-7 cm) | long (7-10 cm) | très long (>10 cm) |
| Oiv 207 | Lignification du pédoncule | à la base seulement | | jusqu'à la moitié | plus de la moitié | |
| 000-11 | Couleur de l'axe de la rafle | 1-coloré | 2-non color | | | |
| Oiv 208 | Forme de la grappe | 1-cylindrique | 2-conique | 3-en entonnoir | | |
| Oiv 209 | Nombre d'ailes de la grappe principale | 1-absentes | 2- Une à deux ailes | 3- trois à quatre ailes | 4- cinq à six ailes | 5- plus de six ailes |

BAIE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| BAIE | | | | | | | | | | | | | |
| Oiv 220 | Longueur Valeur absolue (en mm) : <u>16</u> | | | | | très courte (<8 mm) | courte (8-14mm) | moyenne (14-20mm) | longue (20-26mm) | très longue (>26 mm) | | | |
| Oiv 221 | Largeur Valeur absolue (en mm) : <u>17</u> | | | | | très étroite (<8 mm) | étroite (8-14mm) | moyenne (14-20mm) | large (20-26mm) | très large (>26 mm) | | | |
| Oiv 222 | Uniformité de la grosseur | | | | | 1-non uniforme | 3-uniforme | | | | | | |
| Oiv 223 | Forme | 1- sphérique aplaté | 2- sphérique | 3- elliptique courte | 4- elliptique longue | 5- cylindriq ue | 6- troncovoï de | 7- ovoïde | 8- obovoïde | 9- arquée | 10- fusiforme | | |
| Oiv 225 | Couleur épiderme | | | 1- vert jaune | | 2- rose | | 3- rouge | | 4- gris | | 5-rouge foncé violet | 6- bleu noir |
| Oiv 226 | Uniformité couleur épiderme | | | | 1- non uniforme | | 3- uniforme | | | | | | |
| Oiv 227 | Pruine | | | | nul ou t. fb. | | faible | | moyenne | | forte | | très forte |
| Oiv 228 | Épaisseur pellicule | | | | très mince | | mince | | moyenne | | épaisse | | très épaisse |
| Oiv 229 | Ombilic (apparence) | | | | 1- peu apparent | | 2- apparent | | | | | | |
| 000-18 | Région ombilicale (dépression) | | | | 1- déprimée | | 2- non déprimée | | | | | | |
| Oiv 230 | Coloration de la pulpe | | | | 1-non colorée | | 2- colorée | | | | | | |
| Oiv 231 | Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe | | | | nul ou t. fb. | | faible | | moyenne | | forte | | très forte |
| Oiv 232 | Succulence de la pulpe | | | | 1- peu juteuse | | 2- moyenneme nt juteuse | | 3- très juteuse | | | | |
| Oiv 233 | Rendement en jus (ml / 100g baies) | | | | | | faible | | moyen | | élevé | | |
| Oiv 235 | Fermeté de la pulpe | | | | 1- molle | | 2- légèrement ferme | | 3- très ferme | | | | |
| Oiv 236 | Saveur | | | | 1-aucune | | 2- muscatée | | 3- foxée | | 4- herbacée | | 5-autre |
| Oiv 238 | Longueur pédicelle <u>7</u> | | | | très court (<4 mm) | | court (4-8mm) | | moyen (8-12mm) | | long (12-16mm) | | très long (>16 mm) |
| Oiv 240 | Séparation du pédicelle | | | | 1- très facile | | 2- facile | | 3- difficile | | | | |

PEPINS

| PÉPINS | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Oiv 241 | Formation des pépins | 1- absente (type corinthien) | | 2- rudimentaire (type sultanien) | | 3-complète |
| Oiv 242 | Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7 | très courts | courts | moyens | longs | très longs |
| Oiv 243 | Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : ----- | très faible (<10 mg) | faible (25mg) | moyen (40mg) | élevé (55mg) | très élevé (>65 mg) |
| Oiv 244 | Cannelures transversales face dorsale pépins | 1-absentes | 2-présentes | | | |

ovary étroits (b.p.) 2017

un forte enroulement sur J. f. le 25/6/2015

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2015 2016 + 2017
Code cépage :
Nom introduction : INRA-JK Col 58E
Observateur : LACOMBE + [V6R7s101-105]o//
Code introduction : 5000Mtp213
Emplacement : V6R08 1101-105 + 106-110

| | | LIMBE | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Oiv 065 | Taille du limbe | très petite | petite | moyenne | grande | très grande |
| Oiv 067 | Forme du limbe | 1-cordiforme | 2-cunéiforme | 3-pentagon. | 4-orbicul. | 5-rénif. |
| Oiv 068 | Nombre de lobes | 1-F. entière | 2-trois | 3-cinq | 4-sept | 5- + de sept |
| Oiv 069 | Couleur face supérieure limbe | | vert clair | vert moyen | vert foncé | |
| Oiv 070 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe | 1- nulle | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc. |
| Oiv 071 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe | 1- nulle | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc. |
| Oiv 074 | Profil du limbe | 1-plan | 2-en V | 3-involuté | 4-révoluté | 5-tourmenté |
| Oiv 073 | Ondulation du limbe (entre nerv I ou II) | absente | | | | présente |
| Oiv 072 | Gaufre du limbe (dépression entre nervures I et II) | absente ou t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 075 | Cloûre de la face sup. du limbe (relief entre nervures de dernier ordre) | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 084 | Densité p. couchés entre nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 085 | Densité p. dressés entre nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 086 | Densité p. couchés des nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 087 | Densité p. dressés des nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 088 | Villosité couchée nerv.principales face sup | absente | | | | présente |
| Oiv 089 | Villosité dressée nerv. principales face sup | absente | | | | présente |
| 000-44 | Densité p. couchés limbe face sup. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| 000-45 | Densité p. dressés limbe face sup. | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| | | PETIOLE | | | | |
| Oiv 090 | Densité poils couchés sur le pétiole | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 091 | Densité poils dressés sur le pétiole | nulle à t. fb. | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 093 | Longueur pétiole p/r nervure médiane | plus court | légèrement plus court | égal | légèrement plus long | plus long |
| 000-06 | Couleur du pétiole | 1-coloré | 2-partiellement coloré | 3-vert | | |
| SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
| Oiv 079 | Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole | très ouvert | ouvert | fermé | chevauchant | très chevauchant |
| Oiv 080 | Forme de la base du sinus pétiole | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| Oiv 81-1 | Dent dans la sinus pétiole | absents | | | | présents |
| Oiv 81-2 | Base du sinus pétiole limité par la nervure | 1-non limité | 2- sur un côté | 3- sur les deux côtés | | |
| SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
| Oiv 082 | Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs | 1- ouverts | 2- fermés | 3- légèrement chevauchants | 4- très chevauchants | 5- absence de sinus |
| Oiv 094 | Profondeur des sinus latéraux supérieurs | Absence ou très peu profond | peu profond | moyens | profonds | très profonds |
| Oiv 83-1 | Forme de la base des sinus latéraux supérieurs | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| Oiv 83-2 | Dent dans les sinus latéraux supérieurs | absentes | | | | présents |
| DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
| Oiv 076 | Forme des dents | 1- à deux côtés concaves | 2- à deux côtés rectilignes | 3- à deux côtés convexes | 4- un côtés concaves un côtés convexes | 5- mélange notation 2 et notation 3 |
| Oiv 077 | Taille des dents par rapport à la taille du limbe | très petites | petites | moyennes | grandes | très grandes |
| Oiv 078 | Longueur des dents par rapport à leur largeur | très courtes | courtes | moyennes | longues | très longues |
| AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE | | | | | | |
| Oiv 501 | Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.) | Très faible (<10%) | Faible (11-30%) | Moyen (31-50%) | Élevé (51-70%) | Très élevé (>80%) |

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version OIV 2007, format 2011
très fertile + gr.illon.

Déjà rougissant feuilles base le 25/5/15
= carence magnésium ? oui 2016

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : *(2015) 2016*

Code cépage : *2017*

Nom introduction : *INRA-JKI GR 58E*

Observateur : *LACOMBE*

Code introduction : *500011-213*

Emplacement : *V6R08, 101-105 + 106-110*

BOURGEONNEMENT

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|------------|
| Oiv 001 | Ouverture de l'extrémité | fermé (globuleuse) | demi-ouverte | <u>complètement ouverte</u> | | |
| Oiv 002 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité | <u>1-absente</u> | 2- en liseré | 3-partout | | |
| Oiv 003 | intensité de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 004 | densité des poils couchés de l'extrémité | <u>nulle ou très faible</u> | faible | <u>moyenne</u> | forte | très forte |
| Oiv 005 | densité poils dressés de l'extrémité | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |

JEUNES FEUILLES

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Oiv 051 | couleur de la face supérieure du limbe (4° feuille) | 1- verte | 2- jaune | <u>3- bronzées</u> | 4. cuivrées rougeâtre | |
| Oiv 053 | densité poils couchés entre nervures principale face inf. (4° feuille) | <u>nulle ou très faible</u> | <u>faible</u> | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 054 | densité poils dressés entre nervures principale face inf. (4° feuille) | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 055 | densité poils couchés sur nervures principale face inf. (4° feuille) | <u>nulle ou très faible</u> | <u>faible</u> | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 056 | densité poils dressés sur nervures principale face inf. (4° feuille) | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |

JEUNES FEUILLES DU HAUT (3 PREMIERES DETACHEES)

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 000-28 | Profil | 1. étalées | 2. en gouttière | 3. autres | | |
| 000-29 | Densité poils couchés face inf | <u>nulle ou très faible 299</u> | <u>faible 202</u> | moyenne 203 | très forte 204 | |
| 000-30 | Densité poils dressés face inf | <u>nulle ou très faible 280</u> | moyenne 200 | très forte 201. | | |
| 000-31 | Densité poils couchés face sup | <u>nulle ou très faible 1</u> | <u>faible 3</u> | moyenne 5 | forte 7 | très forte 9. |
| 000-32 | Densité poils dressés face sup | <u>nulle ou très faible 1</u> | faible 3 | moyenne 5 | forte 7 | très forte 9. |
| 000-33 | Couleur face sup. | blanc 205 | fauve roux 206 | carminé 207 | liseré carminé 208 | jaune 209 |
| | | <u>plages bronzées ou cuivrées 210</u> | | | vertes 212 | autre 213 |

JEUNES FEUILLES DU BAS (3 SUIVANTES)

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| 000-34 | Profil | plan 1 | en gouttière 2 | <u>involuté 3</u> | révoluté 4 | tourmenté 5 |
| 000-35 | Densité poils couchés face inf | <u>nulle ou très faible 285</u> | faible 223 | moyenne 224 | très forte 225 | |
| 000-36 | Densité poils dressés face inf | <u>nulle ou très faible 284</u> | moyenne 215 | très forte 216 | | |
| 000-37 | Densité poils couchés nervure face inf | <u>nulle ou très faible 283</u> | faible 217 | moyenne 218 | très forte 219. | |
| 000-38 | Densité poils dressés nervure face inf | <u>nulle ou très faible 282</u> | moyenne 215 | très forte 216 | | |
| 000-39 | Densité poils couchés face sup | <u>nulle ou très faible 1</u> | faible 3 | moyenne 5 | forte 7 | très forte 9. |
| 000-40 | Densité poils dressés face sup | <u>nulle ou très faible 1</u> | faible 3 | moyenne 5 | forte 7 | très forte 9. |
| 000-41 | Couleur face sup. | blanc 226 | fauve roux 227 | carminé 228 | liseré carminé 229 | jaune 230 |
| | | <u>plages bronzées ou cuivrées 231</u> | | entièrement bronzées ou cuivrées 232 | | vertes 233 |

Evita: nulle hypertrophies

*1/2 exigé - horticole (sera traité dans à palmer)
CTL+SNB 11/5/2016*

Formulaire de description 3/8
(Stade floraison)

Année : 2016 + 2017

Observateur : LACOTRE

Code cépage

Code introduction : 5000 M/p 213

Nom introduction : INRA-JKI QP 58E

Emplacement : V6 R08, 101-105 + 106 + 110

Rameau herbacé

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Oiv 006 | Port | érigé | demi érigé | <u>horizontal</u> | demi retombant | retombant |
| Oiv 351 | Vigueur du rameaux | très faible | faible | moyen | <u>forte</u> | très forte |
| Oiv 007 | Couleur face dorsale entrenoeuds | 1- verte | <u>2- verte et rouge</u> | 3- rouge | | |
| Oiv 009 | Couleur face dorsale noeuds | 1- verte | <u>2- verte et rouge</u> | 3- rouge | | |
| Oiv 008 | Couleur face ventrale entrenoeuds | <u>1- verte</u> | 2- verte et rouge | 3- rouge | rouge vif curieux latéral (entre dos et ventral) à l'apex de la Feuille | |
| Oiv 010 | Couleur face ventrale noeuds | 1- verte | <u>2- verte et rouge</u> | 3- rouge | | |
| Oiv 014 | Densité poils couchés entrenoeuds | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 013 | Densité poils couchés noeuds | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 012 | Densité poils dressés entrenoeuds | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 011 | Densité poils dressés noeuds | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 015-2 | Intensité pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons | <u>nulle ou très faible</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 016 | Distribution vrilles | <u>1- 2 ou moins</u> | 2- 3 ou plus | il manque parfois une vrille | | |
| Oiv 017 | longueur vrilles Valeur absolue (en cm) : 24 | très courtes (<10cm) | courtes (15cm) | <u>moyennes (20cm)</u> | <u>longues (25cm)</u> | très longues (>30cm) |

Inflorescence

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Oiv 151 | Sexe de la fleur | 1- mâle | 2- mâle à hermaphrodite | <u>3- hermaphrodite</u> | 4- femelle à étamines réflexes | |
| Oiv 152 | Niveau insertion 1° inflorescence | 1- jusqu'au 2° noeud | <u>2- 3° et 4° noeud</u> | 3- à partir du 5° noeud | | |
| Oiv 153 | Nombre inflorescence/rameau | 1- 1 ou moins | <u>2- 1,1 à deux</u> | 3- 2,2 à trois | 4- plus de trois | |
| Oiv 155 | Fertilité des bourgeons de la base | très faible | | <u>moyenne</u> | | très élevée |
| Oiv 501 | Taux de nouaison | très faible (<10%) | faible 20% | moyen 40% | élevé 60% | très élevé (=>80%) |

Vassal

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 000-42 | Relief surface du rameau herbacé | 1- unie | <u>2- côtelée</u> | | |
| 000-10 | Villosité spéciale du rameau herbacé | 1- épines ou analogues | 2- poils massifs | <u>3- aucune</u> | |
| 000-21 | Couleur des vrilles | 1- jaune | <u>2- rouge clair</u> | 3- rouge foncé | 4- vert |
| 000-43 | Taille du bouton floral | 1- petit | <u>2- moyen</u> | 3- gros | |

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2016 + 2017

Code cépage :

Code introduction : 500011p213

Observateur : Laumbe

Nom introduction : INRA-JKI Gb ~~441E~~

Emplacement : VBR8R 101-105

58

+ 106-110

Sarment

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Oiv 101 | Section transversale | 1-circulaire | 2-elliptique | 3- aplatie | | |
| Oiv 102 | Relief de la surface | 1- uni | 2- côtelé | 3- strié | | |
| Oiv 103 | Couleur générale | 1- jaune | 2- brunâtre foncé | 3- rouge violacé | 4- gris | |
| Oiv 104 | Lenticelles | absentes | | | | présentes |
| Oiv 105 | Poils dressés des nœuds | absents | | | | présents |
| Oiv 106 | Poils dressés des entrenœuds | absents | | | | présents |
| Oiv 351 | Vigueur du rameau* | très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 352 | Croissance prompts-bourgeons | absent ou très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| Oiv 353 | Longueur entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 150 | très courts (<60mm) | courts (90mm) | moyens (120mm) | longs (150mm) | très longs (>180mm) |
| Oiv 354 | Diamètre entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 12 | très petit (<5mm) | petit (8mm) | moyen (11mm) | grand (14mm) | très grand (>17mm) |

Suppléments pour Porte-greffe

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|-----------------------------|-------------|--------|-------|-------|------------|
| Oiv 551 | Rendement en bois/ha | très faible | faible | moyen | élevé | très élevé |
| Oiv 552 | Formation de cal de soudure | très faible | faible | moyen | élevé | très élevé |
| Oiv 553 | Aptitude à la rhizogenèse | très faible | faible | moyen | élevé | très élevé |

Vassal

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--|--------|
| 000-47 | Epaisseur des nœuds par rapport au mérithalle | 1- aplatis | 2- moyens | 3- saillants | | REVOIR |
| 000-48 | Pruine sur sarment | 1- absence | 2- partiellement présente | 3- présente | | |

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »